

WIEŚCI Z POLA

Stan plantacji pszenicy ozimej 07.04.2021 r.



Lokalizacja: woj.zachodniopomorskie, pow. kamieński

Uprawa: pszenica ozima OPAL

Siew: 04.10.2020 (optymalny)

Obsada: 280-300 roślin/m²

Przedplon: rzepak ozimy

Faza wzrostu wg BBCH: 30 – faza początkowego strzelania w źdźbło

Pogoda w ostatnim tygodniu nie pozwoliła zbyt mocno rozpędzić się plantacjom. Utrzymujące się nocne przymrozki i zbyt niskie temperatury w dzień nie pozwoliły wykonać zabiegów T0. Kolejny tydzień zapowiada się podobnie (temperatury w nocy do -2 stopni a w dzień maksymalnie 6-7 stopni). Sytuacja ta spowoduje, że będziemy zmuszeni wykonać często spóźniony zabieg T1. Ważne jest więc, aby zabieg T1 był odpowiednio mocny i precyzyjnie zaaplikowany w sprzyjających warunkach temperaturowych.

Zalecane wykonanie zabiegu T1 w fazie BBCH 31:

Promino 300 EC 0,4 l/ha + Proquin 200 EC 0,2 l/ha + Cycocel 750 SL 1 l/ha + Meros 250 EC 0,3 l/ha+ Full kondycja 0,1 l/ha + Surfad 0,1 l/ha

lub:

Empartis 1 l/ha + Flexity 300 SC 0,35 l/ha (czyli DUET NA START) + Cycocel 750 SL 1 l/ha + Meros 250 EC 0,3 l/ha+ Full kondycja 0,1 l/ha + Surfad 0,1 l/ha



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. Informacje zawarte w reklamie mają charakter archiwalny i zgodne są ze stanem prawnym na dzień publikacji. Ewentualne zmiany w treści etykiet do zweryfikowania z aktualną treścią etykiety produktu na stronach Ministerstwa Rolnictwa