


WIEŚCI Z POLA

Stan plantacji rzepaków 07.04.2021 r.

Lokalizacja: woj.kujawsko-pomorskie, pow. nakielski,
Stacja Doświadczalna COBORU w Chrzęstowie

Uprawa: rzepak ozimy

Siew: 25.08.2020



Na plantacji zastosowano preparat Super 5+w dawce 1,5 kg/ha oraz Profi Bor 2 l/ha. Temperatury dobowe na chwilę obecną były na tyle niskie, że w żółtych naczyniach nie stwierdzono progu szkodliwości chowacza brukwiaczka. W następnych dniach w miarę wzrostu temperatur zalecane będzie zastosowanie regulatora wzrostu z funkcją fungicydu np. **Ventoux 430 SC**, **Tyberius 250 EW**, **Sirena 60 EC**, **Caryx 240 SL**. Wraz z pojawieniem się szkodników (chowacza brukwiaczka) konieczne będzie zastosowanie insektycydów, najlepiej układowych (np.: **Mospilan 25 SP**) i kontaktowych (np.: **Bulldock 025 EC**)

Progi ekonomicznej szkodliwości dla chowacza brukwiaczka:

W przypadku żółtych naczyni = 10 osobników odłowionych w ciągu 3 dni

Przykładowe programy ochrony:

Impro Extra 150 ml/ha + Sirena 60 EC 0,7 l/ha + Tyberius 250 EW 0,7 l/ha + Super 5 1 kg/ha + Profi Mangan 2 l/ha + Mospilan 25 SP 0,25 kg/ha + Bulldock 025 EC 0,25 l/ha + Profi Bor 2 l/ha
lub

Impro Extra 150 ml/ha + Ventoux 430 SC 0,7 l/ha + Profi Bor 2 l/ha + Profi Mangan 2 l/ha + Vigoral Mol 4 l/ha + Trebon 30 EC 0,3 l/ha

