

WIEŚCI Z POLA

Stan plantacji kukurydzy 19.05.2021 r.

Lokalizacja: woj. podlaski, pow. augustowski

Uprawa: kukurydza MASTODON i ZORION

Siew: 04.05.2021

Gleba: lekka, klasy IV-V, pH ok. 6

Przedplon: kukurydza

Faza wzrostu wg BBCH: 10-12 – faza rozwoju liści (z koleoptyla powstaje pierwszy liść)

Nasiona kukurydzy wykiełkowały, na powierzchni pojawił się koleoptyl w zależności od rodzaju gleby. Kilkudniowe ocieplenie pobudziło do intensywnego wzrostu nie tylko rośliny uprawne, ale niestety również chwasty. Najpopularniejszymi chwastami są: komosa biała, chwastnica jednostronna, szarłat szorstki, psianka czarna, rdestówka powojowata, bodziszki oraz lokalnie bylica pospolita i perz. Najpopularniejsze substancje zwalczające powyższe chwasty to: mezontrion, terbutylazyna, pirydant, dikamba, nikosulfuron, rimsulfuron.

Większość substancji dostępnych doglebowo jest z powodzeniem wykorzystywana także podczas zabiegów powschodowych (m.in. izoksafutol, mezontrion, pendimetalia, petoksamid, S-metolachlor, terbutylazyna, tienkarbazon metylu).

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie w fazie trzech liści na mocno zachwaszczone pola:

Lumax 537,5 SE 2,5 l/ha + Mentum 040 OD 1 l/ha + Soiler 0,5 l/ha

W prezentowanej uprawie zastosowany będzie:

Impro Extra 0,2 l/ha + Temsa SC 1 l/ha + Mentum 040 OD 1,25 l/ha + Super Zn 1 l/ha + Surfad 0,1 l/ha

Obecnie zalecane jest sprawdzenie plantacji pod kontem szkodników (m.in.: ploniarki zbożówki) oraz wykonanie zabiegu odchwaszczania powschodowego. Oprysk należy zastosować od fazy 3 liścia właściwego kukurydzy.

Doskonałym rozwiązaniem jest:

Full kondycja 0,2 l/ha + Botiga 390 OD 1 l/ha + Mentum 040 OD 1 l/ha + Profi Zn Xtra 1 l/ha + Surfad 0,2 l/ha

