

WIOSNA '23



ZEPAK

OCHRONA PSZENICY OZIMEJ

NOWY ZESTAW HERBICYDOWY

scandagra.pl

SUPER MOC

W 1 ZESTAWIE

Pixxaro™

Arylex™ active

HERBICYD

Nomad™

75 WG

HERBICYD

Tribe

75 WG

Dassoil

4TE
4F

- Działa w niskich temperaturach: 2°C na chwasty dwuliścienne, 5°C na miotłę zbożową
- Zwalcza przytulię czepną w każdej fazie rozwojowej!
- Najsilniejsze rozwiązanie na miotłę zbożową z grupy HRAC 2 (B) inhibitor ALS
- Skuteczny na: bodziszki, przetaczniki, dymnice, jasnoty czy chwasty rumianowate
- Ograniczenie rozwoju stokłós, szczególnie we wczesnych fazach rozwojowych
- Synergizm trzech substancji z dwóch różnych mechanizmów działania skutkuje różnorodnym działaniem na chwasty



Skuteczność chwastobójcza

Gatunek chwastu	Pixxaro 0,25 l + Nomad 0,12 kg + Dassoil	Pixxaro 0,25 l + Nomad 0,12 kg + Dassoil + tribenuron 15g
bodzisek drobny	85-95%	85-95%
chaber bławatek	70-85%	95-100%*
dymnica pospolita	95-100%	95-100%
fiólek polny	70-85%	70-85%
jasnoty	95-100%	95-100%
miotła zbożowa	95-100%*	95-100%
mak polny	70-85%	85-95%
maruna nadmorska	95-100%	95-100%
ostrożeń polny	60-70%	85-95%
przetaczniki	95-100%	95-100%
przytulia czepna	95-100%	95-100%
samosiewy rzepaku	95-100%	95-100%
stokłosa żytnia	85-95%**	85-95%**
tasznik pospolity	95-100%	95-100%
tobołki polne	95-100%	95-100%


* dla biotypu bez odporności na ALS

** dla stokłosa we wczesnych fazach rozwojowych (doświadczenia własne Corteva)

Wiosna 2022, doświadczenia własne Corteva



Dawkowanie



Produkt	Opakowanie	Substancja aktywna	Dawka / ha	Spektrum działania	Termin stosowania
Pixxaro	1 L	halauksyfen metylu Arylex™ 12 g/l, fluroksypyr meptylu 280 g/l	0,25-0,5 l rej: pszenica, jęczmień, pszenżyto, żyto	przytulia czepna, bodzisek drobny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała	od fazy 3 liści do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego BBCH 13-45. Działa od 2°C
Nomad 75 WG + Dassoil	480 g	piroksulam 75 g/kg	120 g + 0,5 l rej: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime.	miotła zbożowa	do BBCH 31 (pierwsze kolanko). Działa od 5°C
Tribe 75 WG	60 g	tribenuron metylu 750 g/kg (związek z grupy sulfonilomoczniki)	15 g pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary	chaber bławatek mak polny, ostrożeń polny komosa biała, rumian polny	BBCH 12 -29 (do końca fazy krzewienia)

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. Informacje zawarte w reklamie mają charakter archiwalny i zgodne są ze stanem prawnym na dzień publikacji. Ewentualne zmiany w treści etykiet do zweryfikowania z aktualną treścią etykiety produktu na stronach Ministerstwa Rolnictwa.”

**ZAMÓW JUŻ
DZISIAJ**

Nie zwlekaj

Zamówienia on-line: platforma.scandagra.pl

24/7
PODGLĄD FAKTUR
SZYBSZY PROCES ZAMAWIANIA
BEZPOŚREDNI WGLĄD
W STATUS ZAMÓWIEŃ
HISTORIA ZAMÓWIEŃ
...I WIELE INNYCH KORZYŚCI

