



NAWÓZ DOLISTNY

WIELOSKŁADNIKOWY

Trójka, która podnosi plon
+ formuła synergii



Skład nawozu:	%	Skład nawozu:	%
Azot całkowity (N)	18	Siarka (SO ₃)	2,8
Azot azotanowy (NO ₃)	5,3	Mangan (Mn-EDTA)	0,15
Azot amonowy (NH ₄)	3,5	Miedź (Cu-EDTA)	0,1
Azot amidowy (NH ₂)	9,2	Cynk (Zn-EDTA)	0,1
Fosfor (P ₂ O ₅)	18	Żelazo (Fe-EDTA)	0,15
Potas (K ₂ O)	18	Molibden (Mo)	0,01
Magnez (MgO)	1,4	Bor (B)	0,1

WIELOSKŁADNIKOWY NAWÓZ DOLISTNY

Z DUŻĄ ZAWARTOŚCIĄ MIKROELEMENTÓW
OPARTYCH NA CHELACIE **EDTA**

Super 3 to wyjątkowy nawóz dolistny dedykowany do kompleksowej i zaawansowanej uprawy, którego skuteczność oparta jest na formule synergii makro- i mikroelementów. Efekt ten to interakcja pomiędzy składnikami wprowadzonymi w odpowiednich proporcjach, która wielokrotnie zwiększa skuteczność pobierania i działania nawozu. Efektywne współdziałanie składników odżywczych pokrywa potrzeby pokarmowe roślin i maksymalizuje plonowanie. 3 formy azotu zawarte w SUPER 3 zapewniają właściwy rozwój wegetatywny oraz optymalne przejście w fazę generatywną roślin.

- Zbilansowany skład NPK i wysoka koncentracja mikroelementów
- Zawiera 3 formy azotu
- Kształtuje optymalny pokrój roślin
- Mikroelementy oparte na chelacie EDTA
- Stymuluje intensywny i szybki rozwój roślin



Opakowanie:
3 kg, 15 kg

Zalecenia dotyczące upraw

Uprawa	Termin zabiegu	Jednorazowa dawka [kg/ha]	Ilość cieczy użytkowej [l/ha]
Zboże	Jesień od fazy 3-4 liści	2,0-4,0	200-300
	Wiosna faza krzewienia	2,0-4,0	200-300
	od fazy strzelania w źdźbło do fazy kwitnienia co 14 dni	2,0-4,0	200-300
Rzepak	Jesień Jesień, od fazy 4 liści	2,0-4,0	200-300
	Wiosna po ruszeniu vegetacji	2,0-4,0	200-300
	Wiosna Wiosna od fazy wybijania w pęd do fazy kwitnienia co 14 dni	2,0-4,0	200-300
Kukurydza	Wiosna Faza 5-6 liści	2,0-4,0	200-300
	Od fazy 6-10 liści dwa razy co 10-14 dni	3,0-5,0	200-300
	Trzy tygodnie po wschodach	3,0-5,0	200-300
Ziemniaki	Wiosna Faza zawiązywania się bulw dwa razy co 10-14 dni	3,0-5,0	200-300
	Intensywny wzrost bulw dwa razy co 10-14 dni	3,0-5,0	200-300
	Faza 4-6 liści	3,0-5,0	200-300
Burak cukrowy	Wiosna Faza intensywnego wzrostu	3,0-5,0	200-300
	Przed zwarciem międzyrzędzi	3,0-5,0	200-300
	Trzy tygodnie po wschodach	3,0-5,0	200-300
Strączkowe	Wiosna Przed kwitnieniem	2,0-4,0	200-300
	Po kwitnieniu, wzrost wegetatywny	2,0-4,0	200-300

